



د افغانستان د بنوالی د پرمختیا ملی موسسه  
د بنوالی د خصوصی سکتور د پرمختگ حمایه کول

د شفتالو او شلیل د پخوانی خانگرتیاوی



پته: د زراعتی کوپراتیفونو تعمیر، بادام باغ،  
کابل، افغانستان

ایمیل: [info@afghanistanhorticulture.org](mailto:info@afghanistanhorticulture.org)  
ویب: [www.afghanistanhorticulture.org](http://www.afghanistanhorticulture.org)

د اریکی شمیره: +93 (0) 202 232 022



نوموری پروگرام د اروپایی ټولنی لخوا تمولیری

#### ۴. Caldesi Nectarine شلیل کالیدیسی ۷۱۴۸

دا وراپتی د ښه حاصل لرونکی ده. د پوتکی رنگ یی سور او  
جذاب دی. د غوښینی برخی رنگ یی سپین دی. معمولا د جولای  
میاشتی په آخری کی پخیری.



#### ۵. Flavor top Nectarine شلیل فلور تاپ ۶۲۱۹

دا وراپتی قوی ونه لری چی د لور حاصل ظرفیت لری،  
میوه یی غټه، سخته، جوسی، او د ښه خوند لرونکی ده. د  
پوتکی رنگ یی سور او زیر خالونه لری. غوښینی برخه یی  
زیر رنگ لری او زری یی په آسانی سره جلا کیری.



#### ۶. Ambra Nectarine شلیل امبرا ۷۱۴۶

د ژر رسیدونکی انواعو سخته ده او حاصل یی هم ښه دی.  
میوه یی مناسبه اندازه، گرد شکل، او خوند یی نسبتا تیزابی  
دی. پوتکی یی سور رنگ او غوښینی برخه یی زیر رنگ  
لری.



#### د شفتالو او شلیل د وراپتی گانو خانگرتیاوی

##### ۱. Sun crest سن کرسټ ۲۶۰

د لور حاصل لرونکی او قوی ونی درلودونکی دی.  
همدارنگه میوه یی غټه، جوسی او گرده ده. د پوتکی رنگ  
یی زیر او روښانه سره خطونه لری. غوښینه برخه یی  
نسبتا سخته او زری یی په آسانی سره جلا کیری.



##### ۲. May crest مایکرسټ ۶۳۰۳

مایکرسټ د ژر رسیدونکی شفتالو څخه دی چی معمولا د  
می میاشتی په منځ کی پخیری. میوه یی گرد شکل لری، د  
پوتکی رنگ یی سور او د غوښینی برخی رنگ یی زیر  
دی.



##### ۳. Flavor crest فلور کرسټ ۶۳۰۱

ددی وراپتی ونه قوی مگر حاصل یی متوسط دی. میوه  
یی غټه، سخته او د پوتکی رنگ یی زیر دی چی %۷۰ د  
سره رنگ پواسطه پوښل شوی دی. غوښینه برخه یی په  
زری پوری ښیلیدلی ده. خوند یی ښه او معمولا د جون په  
منځ کی پخیری.





## د شفتالو او شلیل د پخوالی خانګرتیاوی

- **د میوه اندازه او شکل:** په اعظمی اندازه د شفتالو او شلیل د میوی انکشاف د هغوی د پخوالی څخه نمایندګی کوی.
- **د میوی رنگ:** د رنگ تغیر د شین څخه سور ته او یا سور او زیر ته چی د میوی په انساجو کی د موجودو پګمنتونو په واسطه تغیر خوری د شفتالو او شلیل د پخیدلو نمایندګی کوی.
- **د میوی د سختوالی او نرموالی اندازه:** د پخوالی په وخت کی د میوی د سختوالی اندازه کمیری چی د پخوالی لپاره بڼه خانګرتیا ده. د میوی سختوالی او نرموالی باید په دومره اندازه وی چی وکولای شو هم یی په تازه ډول استفاده کړو او یا هم میوه لیری مارکیټ ته په بڼه حالت ورسیری.

- **د قند اندازه:** د پخوالی یوه مهمه خانګرتیا ده چی د پخیدلو په وخت کی د میوی د قندو اندازه %۱۰ او یا تر هغه ډیر وی.

## د شفتالو او شلیل د راټولولو وخت:

- د میوو د پخوالی خانګرتیاوی د هغوی د راټولولو د وخت تعیین کونکی دی.
- د شفتالو او شلیل وخته پخیدونکی، متوسط او ناوخته پخیدونکی وراپتی گانو د پخوالی وختونه په سیستماتیک ډول د تحقیق په نتیجه کی مطالعه شوی چی لاندی ذکر شوی.
- د شفتالو او شلیل پخوالی د جولای میاشتی د اوسط څخه شروع کیږی او د اګست میاشتی تر اخره دوام کوی. چی د داسی وراپتی گانو له جملی څخه کالډیسی، می کرست، فلورټاپ، سن کرست او امبرا د لوړ حاصل لرونکی او وخته پخیدونکی دی.
  - فلورکرست، شلیل شب رنگ، ماکس، نمیرینج او بیګ ټاپ د متوسط وخت پخیدونکی وراپتی گانو څخه دی.
  - سمرلیدی، سویت رید، راین سن او اولیوین د ناوخته پخیدونکی وراپتی گانو څخه شمیرل کیږی.

جدول: د شفتالو او شلیل د پخیدلو وختونه

نوع	نمبر	July (جولای)			August (اګست)			September (سپټمبر)		
		زوده	میانه	ناوخته	زوده	میانه	ناوخته	زوده	میانه	ناوخته
کالډیسی	7245			✓						
اس کرست	259			✓						
فلور ټاپ	6302			✓						
سن کرست	260		✓							
فلور کرست	6301				✓					
شلیل شب رنگ	810						✓			
ماکس	7149						✓			
سمر لیدی	7185							✓		
سویت رید	7150							✓		
نمبر 5	7286							✓		
راین سن	7186							✓		
بیټی ګټ	7187							✓		
اولوین	7284							✓		
بیګ ټاپ	7147					✓				
امبرا	7146		✓							

## د شفتالو او شلیل د ساتلو خانګرتیاوی:

- د تودوخی درجه:** د شفتالو او شلیل د ذخیره کولو لپاره تر ټولو مناسبه د تودوخی درجه د (۳-۴) درجه د سانتی ګرید ده. د تودوخی نوموړی درجه کولای شی چی د میوی د ساتلو قدرت تر ۱۰ ورځو پوری ورسوی او دی ته زمینه برابره کړی چی محصول د مارکیټ د تقاضا په وخت کی وړاندی کړو. همدارنگه د میوی د ساتلو وخت د میوی د پخوالی په خانګرتیاوو پوری هم اړه لری. د میوی د ساتلو په وخت کی نامناسبه تودوخه د میوی د خوند خرابوالی او د امراضو د رامنځ ته کیدلو سبب کیږی.
- د رطوبت فیصدی:** د شفتالو او شلیل د ساتلو لپاره د رطوبت مناسبی فیصدی ته ضرورت شته چی باید د (۹۰-۹۵٪) پوری وی. د ساتلو په وخت کی د رطوبت کموالی د میوی کیفیت او بناپست خرابوی.

## د راټولولو وروسته په شفتالو او شلیل کی مشکلات:

- 1: Fruit skin Inking- د میوی د پوټکی سوخیدل
- 2: Lack of Red color د سور رنگ نه معلومیدل
- 3: Internal Breakdown داخلی مشکلات



## د راټولولو وروسته د شفتالو او شلیل عمده مرضونه

- 1: Brown Rot- قهویی ورسټیدل
- 2: Gray Mold- خاکستری پوپنک
- 3: Rhizopus Rot- رښی ورسټیدل

